1 Lit. H wiegt 0,0896 gr
also 2 ——— 0,1790 gr
1 Lit. O —— 1,1430 "

Zusammensetzg.

Durch Synthese ermittelt
man d. Zusammensetzg. d. HO.
füllt in 1 Röhre CuO, evacuirt
H. Kipp, so ergänzt sich dieses
sämmtliches Wasser, das man in
einer Kugel auffängt.
Man füllt nun Kupferoxyd d.
CuO zurück, wägt nun d. abs.
Gewicht d. Wassers, dann d.
des O d. Differenz
beider d. des Wassers.
z. B. es haben sich gebildet:
1725 mgr. HO, nun fand
Gewicht d. Sauerstoff
1536 mgr O,
also 192 mgr. H. es verhält sich
also:
1536 : 192 = 8 : 1

Ergänzungen

Wenn beim Wasser verhalten
indem man H aus Luft nur,
braucht man den nur Verlust dar,
dann gebildeten Menge.
Das HO ist an gewöhnlichen Zustand
flüssig, feuchtet gasförmig auf Papier,
stark den, dann also verhältnis
16 fache dichte darum Wasser
Zahl 1 Blanke Norm. Dann
Gewicht Gew. = 1. bei Verwendung
1000 cubc. HO v 0° gehen
1043 cc HO v 100°.

Dichte p Gefrieren

Es erfolgt Ende d. Verdichtung
Zusammenzieh. des HO wird glas.
wässrig; wenn v. 100° bis
+4° wird die Zusammenzieh. glas.
wässrig, dann findet d. Verdichtung
bis 0 statt wie das HO gefriert.
Man Wasserstoff z. gebrauchen,
so braucht sich 10000 cc. HO v 8°