1 Band d. Borsäure = BO_3 Kr.
d. Borate für einige Kr. grün.
Flammfärbt. 2 d. Borsäure d. Schmelz
al Borax 2 beständen grüne Perle
mit 1 Tafel. (Glasperle).
1 Doppelsalz H_3 d. Boro
natroncalcit mit Perle, das
mannellbraun Borsäure bildet.
1 Salz d. BO_3 Kr. farbt
nicht das mit d. Borsäure
Toscana'r. d. Borsäure BO_3 Salpeter
1 Kreuzen Tassolin.
1 Borsäure d. Borsäure entzündet
Spec. Gr. 2, Kr. mit KO_2, N. KO,
KO durch 2 mit BO_3 bestehen
2 Tage = 100 mehrere – 185°
Borsäure in d. Borsäure mischt
bis zu KO Spuren, 1 Tafel
Borsäure d. 1 Kr. = Borsäure
wird mit 10 d. Spuren durch + ver
einigt wird. d. Abzug. Kr.
+ d. BO_3 in Borsäure mit der
60 g Borsäure BO_3 und 30 g Borax
zusammen mischt. d. Borsäure wird
Brenn mit in besonderen Tiegel
abgibt d. d. Spuren durch
1 Salz Salz in Toscana
Borsäure 10 1 Kilogramm Kilo BO_3
dar.

Chlorbor BCl_3

ist eine flüssige Substanz, die bei gewöhnlicher
Temperatur Salzsäure ausgesetzt.
Spaltet. Spec. Gew. d. Chlorwasserstoffes

Fluorbor BF_3

ist farbloses,
zerfließt sich an Wasser zu
HF BF_3
Borfluorwasserstoffsäure, die
Salze + d. Metall basisch zersetzt
wird.

Borstickstoff NB_3

entsteht d. Glühen von d. Salz mit
+ d. B_2 Salz in 0,3 Salz in Kr. mischt
in Salzsäure. gesetzt + in KO

B_2 N
K_3 O_3