Eisenoxydul.

FeO.

Schwarz, pulverig, Kristallinisch, Kristallen regulär, spaltbar, spezifisch schwerer als Eisenoxyd, bei Luftabschluß.

Spezifisch schwerer als Salze, Säuren, Wasser, Eisenoxydhydrat, Eisenoxydsalze.

Eisenoxydhydrat.

$Fe_2H_6O_3$.

Wird gefällt durch Mischen von Eisenoxydsalzlösung mit Kalilauge, Kalkwasser oder Ammoniak, Pulver, rotbraun, spezifisch schwerer als Wasser, in Wasser unlöslich, geruchlos, geschmacklos, in Säuren leicht löslich.

Auf trockenem Wege entsteht Fe_2O_3 aus FeH_6O_3 durch Erhitzen.

Dient technisch als Reduktions-, volumetrisches Mittel, Farbe, als Reagens zum Nachweis von Phosphorsäure oder PO_4 — in Lösung, feine Salze sind in Wasser löslich, grobe schwer löslich.

Schwefelsaures Eisenoxydul

$FeSO_4 + aq$.

Kristallisiert grünlich, eisenoxydhaltig.

Syn. Eisenvitriol, grüner Vitriol.

Bei 100° verliert es 6 aq, bei 300° (Halbhydrat) 1 aq, weiter erhitzt es SO_3 oder SO_4.

Zum reinen Gebrauch stellt man Eisenvitriol durch Lösung von Eisen in verdünnter