Kohlensaures Kobaltoxydul

CoO. CO_2
wird erhalten durch Fällen einer Lösung von $Co(NO_3)_2$ durch Lösung von K_2CO_3. Der Niederschlag, welcher beim Trocknen $CoCO_3 + 2H_2O$

Salpetersaures Kobaltoxydul

$CoO.NO_5 + 6 aq.$

Löst sich mit rother Farbe in Wasser. Beim Erhitzen entweicht Wasser und salpetrige Säure.

Phosphorsaures Co mit Borax gibt eine schöne blaue Perle.

Kobaltoxyd Co_2O_3.

Kobaltoxyd entsteht durch Erhitzen des Oxydes, Oxydulsalzes, Nitrats oder Carbonats an der Luft. Es ist ein schwarzes Pulver, das in Säuren nicht löslich ist, und zum Färben von Glas und Porzellan angewendet.

Man erhält es durch Behandlung des Oxyduls mit unterchlorigsaurem Natron oder Kalk, indem man erhitzt bis eine Lösung keine Farbe mehr gibt.

Mit Säuren gelangt das Oxyd nicht zur Lösung, sondern es bildet sich Oxydulsalz und Sauerstoff O_2.

Mit Schwefelsäure, Essigsäure und anderen bildet es Salze.

Eine Verbindung die mehr Kobalt als Co_2O_3 enthält, ist, fast, es entsteht beim Erhitzen des salpetrigsauren Kalis mit