zu Dubosq'sch. 9 mächtig.

NaBO$_2$ einzig mögliche Verbindung
d. In_2O_3 + B_2O_3 $\rightarrow$ $In(BO_2)_3$

Im Spectr. einzig Verbindung
wo In löslich ist.

d. Vgl. gab. beim Verdampfen d. Lösung ist in der Hitze gelbes Pulver, in d. Perle einzig.

beim Glühen d. $In_2O_3 \cdot 10B_2O_3$ weißes Pulver, beim Reiben Glänzen bezeichnend d. Grünen färbbar.

Gewinnung d. Ink. aus Galmei, Blende d. Rösten, d. soll d. In d. d. Lösung verdünnt wird, d. In d. Destillation von Zink.

(Salzsäure, Essigsäure, Schwefelsäure, Königswasser.)

Das Erz soll so fein als möglich, Verwendung ist wie weiter d. Zinn, Eisen, Bismuth, Arsen, Zink, d. Schwefelblei, Schwefelkupfer, welche beide beim Lösen in Salzsäure als Gase zur Entwicklung bleiben.

d. Reinigung. d. In. wird durch Umkrystallisiren vorgenommen.

Reines Ink für analyt. Zwecke Darstellung d. Glühen d. In. d. Oxyd in Porzellanschale Porzellan, Tiegeln.

Das feine Pulver. Verwendung ist empfohlen z. Verdünnen feiner grosse Reinheit d. Substanz beim Spectrum Untersuchen z. feine Verdünnung bei einander Untersuchen.

d. Salze d. In. d. Oxyd, neue Tiegeln z. Untersuchen, evtl. ev. — gelbes Pulver — Ink,