Nicht lösbar Salz wird als ein Gra-
ben Incrustation.
Hg_2Cl ist nicht in einander. Sch-
wärzer Löslich t in Königsw.;
ebenso in einander. Hg d Löslich
von Chlorid.
In der Hitze verflüchtigt $\bar{J}$ e Chlorid
ohne zu schmelzen.
Von Schwefelgas lagt ab $\bar{J}$ bleibt
in $HgCl$ 2 Cl, extrahiren durch da
braunes Schwefel Hg reinen Calomel.
Mennigfärbung d Sublimat mit
Calomel, wird ~~mag~~ an der Gelbig,
keit d Sublimats von großer
Flüchtigkeit, erkannt wenn durch
Erhitzen mit KJ ersetzt das
Chlorür sogleich bleibt, d Chlorid
$\bar{J}$ vollkommen löst; ist dieser
beim Sublimat, verschwindet, so daß
die Lösung nicht $\frac{1}{2}$ Vol gefüllt.
Schwärzung beim Erhitzen
keinen Rückschluß, wohl aber
mit KJ Erhitzen.

Man kennt mit Wasserstoffgas
d Hg d Brom
Dunkelbraunrot $HgBr$ in K löslich,
" braunes $HgBr$
in K löslich.
Gemenge d 2 Verbindungen d
$\frac{1}{100}$ d Luft;
d Hg $\frac{1}{100}$ d
entsteht d Benzin von 100 gr Hg
mit 127 gr. J als rothes
Pulver.
$\bar{J}$ mischen Mg erhält man ab
d Kalium einer Lösung von d
Hg Mg und KJ.

$HgCl_2$ Mg
KJ
mischung gelber, ~~rother~~ rother Nieder-
schlag.