Glycolsäure oder Oxyessig-
säure.

$C_4H_4O_4$ = $C_4H_3O_2\{OH_2$ } 2

$C_4H_3(HO_2)O_4$

= Glycocol + NO_3.
aus Chlor + Oxydation mit
Essigsäure.

Die einfachste Form der Oxysäuren

Milchsäure.
Oxypropionsäure $C_6H_6O_6$.

Die 2 der Propionsäure Radikale
bildet. Die findet in saurer Milch,
in saurem Gurken, Sauerkraut,
alkoholischer Gährung z. Zucker,
wenn Kasein allein in saurer
Milch, die faulenden Stoffe z. Brod
mengt. Sie bildet mit Milchsaurer
Kalk. Aus Magensaft gewonnen

Die M. säure ist farblose syrupöse Flüs-
sigkeit. Sie verflüchtigt sich
im Vakuum und entstehen $C_6H_5O_5$.
bei fortdauern Erhitzen bildet
die Lactid $C_6H_4O_4$.

Das Milchsaure Kalk $+ 5H_2O$ Krist
krystallisiert; das δ der 5 Krystallw.
entweicht bei 3 aq.

Die freien Säuren sind
syrupöse Flüssigkeit nicht fest zu
destillieren ist, da sie Wasser
abgeben, dann Kalkfrei zu
4 aq. + dann Traubenzuckerfrei zu
2 aq. krystallisiert.

Die Säuren [illegible]
verschiedene Gruppen haben,
so sind sie [illegible]