

Ammonites alternans Buch. α' , γ' .

- *alternans quadratus Qu. = Bauhini Op. β .
- alternans ovalis Qu. α' .
- (alternans) gracilis Ziet. α .
- †Gümbeli Op. = bidentosus Qu., J. 76,4, γ .
- (Kapffi Op., Lägern.)

Gruppe der Armaten u. Perarmaten.

(Subgenus: Aspidoceras.)

Amm. *Backeriae Busch = distractus Qu., J. 71,4, Br. ζ W. α .
= Backeriae distractus Qu., C. 16,7.

- *septenarius Qu. δ , δ' .
- perarmatus Sow. γ . Normalform Qu., C. 16,12. J. 75,14.
- *perarmat. mammillaris Qu., C. 16,11. γ .
- perarmatus oblongus Qu. = Oegir Op. α' .
- perarmatus impressae Qu. α , cf. biarmatus Ziet. ζ/α .
- *perarmatus var. (cf. bifer Qu., aus Lias β) γ .
- bispinosus Ziet. = longispinus Sow. ζ .
- Reineckianus Qu. γ = cf. platynotus Rein. γ .
- Galar Op. = cf. cyclodorsatus Mösch γ .
- †hypselsus Op. α' .
- †eucyphus Op. α' .
- (*Rotari Op., Brugg im Aargau.)
hoplisus Op. ζ Solnhofen, cf. bispinosus Qu.

Dazu Riesenbispinosen Qu. aus β , γ , γ/δ (den Uebergang bildend zu den Inflaten).

Gruppe der Bullaten.

*Amm. microstoma impressae Qu., Ceph. 15,6.
= Chapuisi Op. α .

Gruppe der Canaliculaten.

Amm. canaliculatus Buch = canalicul. albus Qu. α , β , α' , β' .

- †hispidus Op. α .
- *Marantianus d'Orb. α , β .
- *semifalcatus Op. α , β , α' , β' .