d. f. narodinda Salpetersäure NO_3, so
minut d. Schwefelsäure ab $\frac{1}{10}$ prozentiga
Wasser mit, so ab bildat sig Mono-
hydrat. Från Svavlan dunsar svav-
elsyrad, medan av d. Salpeter gold
Kväve förfall.
Man använder förutom denna Kväve-
även d. Kvävs klorsyrade Alkalier
av Kali- el Natron-Salpeter $KClO_3$ el
av Kali- el Natron-Salpeter $NaClO_3$
Vid Oxydationen antager Kväve-
föreningen, som förut d. Kväve
innehållit, olika Grader af Syre-
mättnad, så att bildas Kväve-
Syrlig Gasarter. Genom NO_2 el N_2O_3
Vatten och Svavelsyrad Kväve-
oxid NO el N_2O_2 som
Kväve-Syre-Gas NO_4 el N_2O_4
Oxydationen sker lättast genom
Värme, som förut d. Kväve
Syrlig Gasarter, som
dessa genom förut Svavel-
syrad Kväve-Syre-Gas NO_4 el N_2O_4
Oxydationen går lättast vid
Mängd af $\frac{3}{5}$ förut Oxydation af NO_2
Vid Oxydationen bildas Kväve
Syrlig Gasarter, som
dessa genom förut Svavel-
syrad Kväve-Syre-Gas NO_4 el $N_2O_4