Die prakt. Darstellung der Kieselsäure und
d. Kiesel. zu unterscheiden. Da man durch + zu HO
- freies Chlor entwickelt, indem
es Platz folgende Atome HO +
entstehen, wenn Chlor in Anwendung
Verbindung gebracht wird. Da
1 Aequivalent Wasser 1 Aequivalent
zu HO + unterchlorige Säure
gibt 1 Aequ. Regenbogenfarbe. Der
Act, dass 1 Atom HO
ein Aequivalent zu 1 Aequivalent HCl
Chlor entwickeln kann
ist wichtig folgender:
Kommt 1 Atom entsteht 9gr
HO + 40gr Cl, HO sowie HCl
+ Chlor. Verbindung entsteht
= 6, so entwickelt
9 gr HO zu 40 gr Monohydr 2 Atom
9 " " " 58 " Bihydr. 1 Atom
9 " " " 67 " Trihydr 1 Atom
Berührt 1 54 gr HO mit 40 gr
Anhydrid so entwickelt +
10 Atome. Aus Gründen folgen,
da Atom HO entwickelt
manches mangel ist 16 Chlor,
gefunden.
Wasserstoff + SO_3 HO mit
HO mit, also SO_3 HO zu Cl
gasförmig, 1 flüssig
macht, entwickelt Chlor
+ Atom, wenn Hg glasiert
Zeit + Atome Gemenge
1 Verbindung 16 HO zu Cl.
Da + dem 1 Atom Chlor
Atom angeg. gröbt Quantität,
Stabil ist. Kraft + Temperatur.
1 Cl + 4 Cl. SO_3 HO gibt 1 Temperatur
von 40–60° ab pl
1 Cl + 4 Cl + Cl 1
Temperatur von + 10° bis + 20°.