Schwere Spate, feine spaltbare Gemenge mikroskopisch. In reinem CO₂ Strom bis 1 Stunde, bläht sich gegen 200° CO₂ entweichen MgO. 2 CO₂ entsteht, 3 Stunden Hitze 9 Stunden bis Phasen Kohlensäure ab 2 Stunden

$$MgCO_3 + 3aq.$$

Verbindung bildet 9 Stunden

Mg OH und

KOH CO_2 und Verwendung als anorganische Kohlensäure entsprechen einzigen Hydrate da 6 Stunden gegen

$$MgCO_3 + 3aq.$$

beim Kochen mit Kohlensäure entsteht Verbindung mehr 2 basisch Kohlensaures Salz

$$4MgO\,3CO_2 + 3H_2O$$

oder $5MgO\,4CO_2 + 9H_2O$

oder nach 2 Stunden,

zwar 1 einwertiger Äquivalent CO_2 2 MgO.

Salz 11 % Magnesia alba der Apotheken.

Kohlensaures Salz entsteht bei Einwirkung von Magnesia-Salzen mit $MgSO_4$ in geschlossenen Röhren bei 200°,

ab entsteht Salz CO_2, $MgCO_3$ + $NaSO_4$, 9 gewonnen Stunden 9 Stunden schwefelsaures Salz Stunden 2 $MgCO_3$.

Im Großen wird 1 $MgCO_3$ 9 Krystalle mit den Kohlen, einzigen von Kohlensäuren, Kohlensäure [illegible].