wenn man weiß daß
35,5 gr Cl entsprechen 43,6 MnO_2.
daß Chlor bestimmt soll in einer kalten
verdünnten Lösung von KO oder NaO zu setzen
ob nicht schwierig. Mag.
2) Um den Mangan bestimmt mit
der Oxydation zu Eisenvitriol
1 Braun MnO_2.
~~Mn O SO_3~~
Fe O SO_3 + Aq. SO_3
Fe O SO_3 + Aq.

43,6 MnO_2 oxydiren 278 gr. Eisen-
vitriol. Die Vollendung
der Reaction erkennt man durch
Oxyd Cyaneisenkalium als Ferricyan-
Kalium. (s. dort)
3.) Um den Mangan bestimmt zu
bestimmen. ~~Mn O~~ als
Oxalsäure durch MnO_2.
~~Mn O C~~
CO_2 KO
CO_2 KO

so entspricht Kohlensäure zu Oxalsäure
MnO, oder das Gewicht von SO_3 zu
Oxalsäure, Kohlensäure zu MnO SO_3.
so 44 gr CO_2 Sauerstoff 43,6 MnO_2.
oder 1000 mgr CO_2 — 991 mg MnO_2.
Wenn Gewicht der Mangan zu
mit 2 Chlorwasserstoff Säure, Chlor,
Chlorwasser Kohlensäure, Chlor entwickelt
HSO_4, so muss MnO_2 in Lösung
mit Oxalsäurem Kali auflösen.
Cyaneisenkalium bestimmt Gehalt der
HSO_4 mit MnO_2 zusammen,
der Gewichtsverlust gibt den
Gehalt der entwickelten CO_2 an.

die Bestimmung des Gehaltes an HSO_4
Gewicht HSO_4 gutrechnet.